

Polynome – Vielfachheit von Nullstellen – ...

Verwenden Sie vorzugsweise für Dezimalbrüche echte Brüche, das erleichtert in vielen Fällen das Rechnen. Zeichnen Sie nach Möglichkeit alle Graphen in das Standard-Koordinatensystem oder benutzen Sie GeoGebra. Überprüfen Sie die Rechnung anhand der Graphen.

Aufgabe 1

Gegeben sind die reellen Funktionen

$$\begin{aligned} f_1 : x &\mapsto -x^3 - 2x^2, & f_2 : x &\mapsto -x^3 - 4x, & f_3 : x &\mapsto -x^3 + 4x, \\ f_4 : x &\mapsto -\frac{1}{4}x^3 + 2x^2 - 4x, & f_5 : x &\mapsto -\frac{1}{4}x^4 - x^2, & f_6 : x &\mapsto -\frac{1}{4}x^4 + x^2, \\ f_7 : x &\mapsto -\frac{1}{64}(x-4)^2 \cdot (x^2 - 2x - 8), & f_8 : x &\mapsto -\frac{1}{64}(x-4)^2 \cdot (x^2 + 2x - 8) & f_9 : x &\mapsto \frac{1}{64}x^4 - \frac{3}{8}x^2 + \frac{9}{4} \end{aligned}$$

1.1 Untersuchen Sie die Graphen auf Symmetrie.

1.2 Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionen für $x \rightarrow \infty$ und $x \rightarrow -\infty$.

1.3 Bestimmen Sie die Nullstellen der Funktionen. Geben Sie f in der Linearfaktorzerlegung an.

1.4 Ermitteln Sie mit Hilfe einer Tabelle das Vorzeichenverhalten.

Geben Sie die Wertemenge W_f an. (Ist nicht für alle Graphen exakt möglich.)

Für alle Parameterwerte gilt : $k \in \mathbb{R}$.

Aufgabe 2

Gegeben sind die reellen Funktionen $f : x \mapsto -\frac{1}{8}x^4 + kx^3 - 6x^2 + 8x$ und $p : x \mapsto \frac{1}{2}x^2 - 2x$

2.1 Bestimmen Sie k so, dass der Graph G_{f_k} an der Stelle $x_0 = 4$ eine Nullstelle besitzt.

Bestimmen Sie für diesen Fall alle Nullstellen von $f_{1,5}$ mit ihren Vielfachheiten. ($k = 1,5$) [6]

Für alle folgenden Aufgaben gilt: $k = 1,5$.

2.1 Geben Sie den Funktionsterm von f als Produkt von Linearfaktoren an. Untersuchen Sie das Verhalten von f für $x \rightarrow \infty$. Bestimmen Sie mit Hilfe einer Vorzeichentabelle den Bereich, für den $f(x) < 0$ ist. [4]

2.3 Berechnen Sie die Nullstellen von G_p sowie die Koordinaten des Scheitels. Zeichnen Sie G_p . ($x_S = 2$) [6]

2.4 Berechnen Sie die Koordinaten aller Schnittpunkte von G_f und G_p . [6]

Aufgabe 3

Gegeben sind die reellen Funktionen $f_k : x \mapsto \frac{1}{8}x^3 - kx - 2$ und $g : x \mapsto -\frac{1}{2}x - 2$

3.1 Bestimmen Sie k so, dass der Graph G_{f_k} an der Stelle $x_0 = -2$ eine Nullstelle besitzt.

Bestimmen Sie für diesen Fall alle Nullstellen von $f_{1,5}$ mit ihren Vielfachheiten. ($k = 1,5$) [6]

Für alle folgenden Aufgaben gilt: $k = 1,5$.

3.2 Geben Sie den Funktionsterm von f als Produkt von Linearfaktoren an. Untersuchen Sie das Verhalten von f für $x \rightarrow \infty$. Bestimmen Sie mit Hilfe einer Vorzeichentabelle den Bereich, für den $f(x) < 0$ ist. [4]

3.3 Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte der Graphen G_f und G_g . ($x_{1/2} = \pm 2\sqrt{2}$) . [5]

3.4 Der Graph der linearen Funktion h schneidet den Graphen von $f_{1,5}$ an den Stellen $x_0 = -2$ und auf der y -Achse. Bestimmen Sie den Funktionsterm $h(x)$ und die Koordinaten aller Schnittpunkte. ($h(x) = -x - 2$; $x_3 = 2$) [5]

3.5.0 Der Graph G_p einer Parabel p schneidet den Graphen G_f bei $x_4 = 4$ und verläuft durch die Punkte $P(-1|2,5)$ und $Q(1|4,5)$.

3.5.1 Bestimmen Sie den Funktionsterm der $p(x)$ der Parabel. ($p(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$) [6]

3.5.2 Berechnen Sie die Nullstellen von G_p sowie die Koordinaten des Scheitels. Zeichnen Sie G_p . ($x_S = -2$) [6]

3.5.3 Berechnen Sie die Koordinaten aller Schnittpunkte von G_f und G_p . ($x_6 = -6$) [8]


3.6.0 Die Geraden g und h sind Geraden eines Geradenbüschels $b_a(x) = (a + 1)x - 2$.

3.6.1 Bestimmen Sie a_g bzw. a_h jeweils so, dass man die Geraden g bzw. h erhält. [2]

3.6.2 Machen Sie sich anhand der Graphen klar, dass jede der Geraden b_a die Parabel p schneidet.

3.6.3 Zeigen Sie durch Rechnung, dass für alle a genau zwei Schnittpunkte existieren. [6]

Zu Aufgabe 2



Zu Aufgabe 3

